

XLV Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17318790570

Capítulo: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

Tipo
Póster

Título

Hiperplasia Nodular Focal em homens: um desafio diagnóstico

Introdução

A hiperplasia nodular focal (HNF) é uma lesão hepática benigna relativamente comum em mulheres. Existem poucos casos descritos em homens, pelo que o diagnóstico permanece um desafio. Apresentamos o caso de um doente com HNF de modo a alertar para a necessidade de excluir outros diagnósticos e investigar a evolução desta condição em homens.

Material e Métodos

Doente do sexo masculino, 36 anos, antecedentes de melanoma maligno, referenciado à Consulta Externa de Cirurgia após deteção, em Ressonância Magnética (RMN) hepática, de um nódulo com 47x40mm, no segmento VII, hipercaptante na fase arterial, com discreto hipersinal em T2, sugestivo de HNF, não se podendo excluir adenoma.

Resultados

Caso discutido em Consulta de Grupo Multidisciplinar e, face ao historial do doente e dúvida diagnóstica, decidida realização de biópsia. Realizada biópsia ecoguiada de lesão com cerca de 45mm, praticamente sem tradução ecográfica. Resultado histológico compatível com HNF, pelo que o doente mantém vigilância.

Discussão

A HNF é rara em homens, sendo que estes representam menos de 15% do número total de casos. Neste grupo, estas lesões parecem ser menores e mais frequentemente atípicas. Nos casos que cumprem os critérios de diagnóstico da RMN, a especificidade deste exame atinge perto dos 100%. Já os adenomas hepáticos são também raros em homens, estando associados a malignização neste género, pelo que têm indicação cirúrgica. Assim, perante um doente com esta suspeita é fundamental descartar outros diagnósticos.

Hospital:

Autores: Tatiana Moreira Marques, Diogo Melo Pinto, Fernando Guedes Baptista, José Pedro Gonçalves, Pedro Soares Moreira, Rita Peixoto, Gil Faria