# XLVI Congresso SPCir
## Resumo Póster

**ID Resumo:** 17638581740
**Capítulo:** Coloproctologia

**Tipo**
Póster

**Título**
Hamartoma Retrorretal - Abordagem posterior clássica (via transsacral de Kraske).

**Introdução**
O hamartoma retrorretal, também conhecido como quisto do intestino caudal é uma lesão congénita rara que surge a partir de remanescentes embrionários do intestino posterior, apresentando-se como uma massa pré-sacral multiquística. São frequentemente assintomáticas e descobertas incidental, mas podem manifestar com sintomas inespecíficos como dor, obstipação ou perturbações miccionais, pelo efeito de massa local.

**Material e Métodos**
Mulher de 54 anos. Com AP de SII. Em seguimento em Consulta de Gastroenterologia. Realizou RM que mostrou formação Quística retro-retal de 28x16 mm. Colocada hipótese de Tailgut cyst ou de Teratoma quístico tendo sido encaminhada para consulta de Cirurgia Geral. Foi feita a proposta de exérese de lesão abordagem posterior clássica (via transsacral de Kraske).

**Resultados**
O procedimento decorreu sem intercorrências. Teve alta ao D3 de Pós-operatório Histologia da peça revelou: "Aspectos morfológicos compatíveis com hamartoma retro-retal cístico com reação inflamatória crónica granulomatosa associado.

**Discussão**
O Hamartoma retro-retal é uma lesão rara. O diagnóstico é muitas vezes tardio. A maioria seja benigna, já foram descritos casos de transformação maligna o que realça a importância de uma avaliação histopatológica e de uma excisão cirúrgica completa para prevenir a recorrência e abordar o risco oncológico. A imagiologia, particularmente a RM é essencial para a avaliação pré-op e planeamento cirúrgia, enquanto a biópsia é reservada para lesões sólidas, pelo risco de disseminação local.

**Hospital:**
**Autores:** Luís Cardoso ; Catarina Rocha ; Alexandra Carrazedo ; Diego Perez ; Andre Aseiro ; Andre Silva ; Beatriz Lourenço ; Bruna Meireles ; Bernardo Casal ; Lilia Meireles