XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17633371010
Capítulo: Coloproctologia

Tipo
Póster

Título
Invaginação colo-cólica no adulto: apresentação rara de adenocarcinoma mucinoso do cólon

Introdução
A invaginação intestinal é mais comum nas crianças sendo que apenas 5% ocorre em adultos. A invaginação tipo colo-cólica é a mais rara (<15%) e está associada a neoplasia em 60% dos casos. Apenas 10-15% dos adenocarcinomas do cólon são do tipo mucinoso, sendo que a sua apresentação como invaginação colo-cólica a condicionar oclusão representa <1%, tratando-se de uma apresentação clínica extremamente rara.

Material e Métodos
Mulher de 56 anos, com antecedentes de policitemia vera e tuberculose pulmonar, medicada com hidroxiureia e aspirina.

Resultados
Apresentou dor abdominal, vómitos e ausência de trânsito intestinal com 3 dias de evolução. Ao exame objetivo apresentava abdómen distendido e doloroso. O Rx abdominal apresentava níveis hidroaéreos e a TC revelou invaginação colo-cólica do transverso, com dilatação a montante, sugestiva de oclusão intestinal. Realizou-se hemicolectomia direita radical por suspeita de neoplasia. Apresentou evolução clínica favorável, com alta ao 3º dia. O exame anatomopatológico demonstrou adenocarcinoma invasor, com componente mucinoso em 70% da lesão, pT3N1a (1/23). Na consulta de grupo oncológico, decidiu-se realização de quimioterapia adjuvante, que está a decorrer.

Discussão
A invaginação colo-cólica deve ser considerada maligna até prova em contrário. Quando condiciona necessidade de intervenção cirúrgica urgente é essencial aplicar os princípios de uma resseção oncológica, permitindo um correto estadiamento, definição de prognóstico e da necessidade de tratamento adjuvante.

Hospital:
Autores: Daniela S. Martins, Alexandra Rocha, Hugo Moreira, Carolina Tavares, Catarina Ortigosa, Hugo Louro, Sílvia Costa, Carlos Manuel Soares, Carmen Carvalho, Bela Pereira