

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639353500

Capítulo: Colo-Proctologia

Tipo
Póster

Título

Lipoma do cólon como causa rara de invaginação intestinal no adulto: caso clínico

Introdução

A invaginação intestinal é uma entidade rara no adulto, representando cerca de 1% das oclusões intestinais. Em 80-90% dos casos existe uma causa orgânica subjacente e, devido ao risco de malignidade estimado em aproximadamente 65%, a ressecção cirúrgica é geralmente indicada. A tomografia computadorizada (TC) constitui o exame de eleição, permitindo confirmar o diagnóstico e identificar o ponto de partida.

Material e Métodos

Caso Clínico.

Resultados

Mulher, 50 anos. Recorre ao serviço de urgência por quadro de dor abdominal com 5 dias de evolução no flanco direito associado a hematoquezias, vômitos e sensação febril. Encontrava-se febril e com abdómen doloroso a palpação do hipocôndrio e flanco direitos. Laboratorialmente apresentava aumento dos parâmetros inflamatórios e a avaliação imagiológica por TC mostrou "invaginação do íleon terminal e parte do cego pelo lúmen do cólon ascendente (aproximadamente 19 cm de extensão), terminando ao nível do ângulo esplénico, condicionada por uma lesão lipomatosa." A doente foi submetida a hemicolectomia direita alargada via laparoscópica. O pós-operatório decorreu sem intercorrências, com alta ao terceiro dia.

Discussão

Este caso demonstra que, apesar de benignos e responsáveis por cerca de 0,2% dos tumores do cólon, os lipomas podem tornar-se sintomáticos quando são de grandes dimensões, originando dor abdominal, hematoquezias ou mesmo invaginação intestinal. Embora lesões pequenas possam ser tratadas endoscopicamente, lipomas volumosos ou complicados exigem abordagem cirúrgica.

Hospital:

Autores: Ana Sofia Lopes, Joana César, Teresa Causí, Inês Seixo, Pedro Rodrigues, Raquel Lalanda, Costa Gomes, Miguel Ângelo, Luís Miranda