# XLVI Congresso SPCir
## Resumo Comunicação Oral

**ID Resumo:** 17639370280
**Capítulo:** Coloproctologia

**Tipo**
Comunicação Oral

**Título**
Fatores que influenciam a morbilidade após hemicolectomia direita - a casuística de um centro

**Introdução**
A incidência das neoplasias do cólon direito (cego, cólon ascendente e ângulo hepático) aumenta progressivamente com a idade, sendo mais frequente em idosos e mulheres. Estes surgem de forma mais insidiosa com sintomatologia inespecífica já associada a estádios mais avançados.

**Material e Métodos**
Estudo retrospetivo de doentes com diagnóstico de neoplasia do cólon direito entre 1/01/2019 e 31/12/2024. Análise de fatores como a idade, sexo, ASA, tipo de cirurgia e a ocorrência de progressão da doença e óbito.

**Resultados**
A idade no diagnóstico mostrou uma associação com mortalidade e complicações. A amostra incluiu 192 doentes. A taxa de óbito no follow-up foi de 11,9% no grupo mais jovem e de 28,8% no grupo mais velho, com significância estatística ($p < 0,05$). As complicações foram mais frequentes nos doentes mais velhos (38,4% vs 22,4%), com $p < 0,05$. A escolha da via laparotómica versus laparoscópica foi maior nos mais idosos, com mais complicações associadas ($p < 0,001$). A tendência observada sugere que doentes com ASA mais alto (pior estado físico) podem ter maior probabilidade de evolução desfavorável (M+), mas esta relação não foi estatisticamente significativa.

**Discussão**
A idade é um fator determinante para mortalidade e complicações, mas não para progressão. A via laparoscópica apresenta uma tendência para menor taxa de M+. A mortalidade parece estar mais relacionada com idade e ASA. A amostra disponível é insuficiente para confirmar diferenças, o que limita a robustez das conclusões.

**Hospital:**
**Autores:** Rita Gonçalves, Ana Rita Lourenço, Nicole Silva, Sofia Coelho, Beatriz Louro, Inês Mendonça, Olena Teslyak, Helena Devesa, Paulo Sintra