

XLVI Congresso SPCir

Resumo Comunicação Oral



ID Resumo: 17639370280

Capítulo: Colo-Proctologia

Tipo

Comunicação Oral

Título

Fatores que influenciam a morbidade após hemicolectomia direita - a casuística de um centro

Introdução

A incidência das neoplasias do cólon direito (cego, cólon ascendente e ângulo hepático) aumenta progressivamente com a idade, sendo mais frequente em idosos e mulheres. Estes surgem de forma mais insidiosa com sintomatologia inespecífica já associada a estádios mais avançados.

Material e Métodos

Estudo retrospectivo de doentes com diagnóstico de neoplasia do cólon direito entre 1/01/2019 e 31/12/2024. Análise de fatores como a idade, sexo, ASA, tipo de cirurgia e a ocorrência de progressão da doença e óbito.

Resultados

A idade no diagnóstico mostrou uma associação com mortalidade e complicações. A amostra incluiu 192 doentes. A taxa de óbito no follow-up foi de 11,9% no grupo mais jovem e de 28,8% no grupo mais velho, com significância estatística ($p < 0,05$). As complicações foram mais frequentes nos doentes mais velhos (38,4% vs 22,4%), com $p < 0,05$. A escolha da via laparotômica versus laparoscópica foi maior nos mais idosos, com mais complicações associadas ($p < 0,001$). A tendência observada sugere que doentes com ASA mais alto (pior estado físico) podem ter maior probabilidade de evolução desfavorável (M+), mas esta relação não foi estatisticamente significativa.

Discussão

A idade é um fator determinante para mortalidade e complicações, mas não para progressão. A via laparoscópica apresenta uma tendência para menor taxa de M+. A mortalidade parece estar mais relacionada com idade e ASA. A amostra disponível é insuficiente para confirmar diferenças, o que limita a robustez das conclusões.

Hospital:

Autores: Rita Gonçalves, Ana Rita Lourenço, Nicole Silva, Sofia Coelho, Beatriz Louro, Inês Mendonça, Olena Teslyak, Helena Devesa, Paulo Sintra