XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17637673121
Capítulo: Outros

Tipo
Póster

Título
TPN fora dos moldes: Tratamento de úlceras de embolização sética em pé diabético

Introdução
A terapia de pressão negativa (TPN) é uma ferramenta fundamental no tratamento de feridas, acelerando as etapas de cicatrização e diminuindo a infeção e a exsudação. No pé diabético está indicada em feridas pós-operatórias complexas ou com maior perda de tecido

Material e Métodos
Caso clínico

Resultados
Homem de 53 anos, sem antecedentes pessoais conhecidos, recorreu ao SU por poliúria, polidipsia, polifagia, perda ponderal e sinais inflamatórios dos membros inferiores bilateralmente. Analiticamente, hiperglicemia, PCR de 268,9 e bacteriemia por MRSA. Diagnóstico inaugural de DM tipo 2 e celulite bilateral dos membros inferiores. Internado para estabilização, estudo e antibioterapia, com desenvolvimento de 3 abcessos nos pés por embolização sética de celulite. Dada neuropatia sensitiva, submetido a drenagem e desbridamento em regime bed-side, resultando em 3 locas, uma delas com exposição tendinosa múltipla. Aplicada TPN com pressão de 125 mmHg, conexão em Y e cuidados de penso seriados durante cerca de 2 meses, transitando gradualmente para penso simples. Resolução completa das úlceras

Discussão
Apesar da úlcera por embolização sética não ser a apresentação típica de pé diabético, tratando-se, após drenagem e desbridamento, de uma ferida pós-operatória, foi aplicada a abordagem de um pé diabético neuropático operado com resolução do quadro. A TPN aplicada a estes casos é um tratamento possível, ainda que desafiador, exigindo vigilância e avaliação seriadas, com ajuste dos apósitos e parâmetros sempre que adequado

Hospital:
Autores: Vânia Moreira; Catarina Viveiros; Marta Martins; Ana Constante; Sara Serra; Maria Jesus Dantas