

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639303311

Capítulo: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço

Sessão de Apresentação: PO1 (Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço)

Tipo
Póster

Título

Massa Cervical de Crescimento rápido - a importância da celeridade diagnóstica

Introdução

A existência de uma massa cervical de crescimento rápido deve fazer pensar no diagnóstico de carcinoma anaplásico da tireoide. Apesar do mau prognóstico, o diagnóstico definitivo e o estadiamento deverão ser céleres.

Material e Métodos

Apresentam-se dois casos clínicos de massa cervical de crescimento rápido.

Resultados

Caso 1: Mulher de 66 anos. Massa cervical dolorosa com cerca de 4 semanas de evolução, associada a disfonia e disfagia. Ao exame objetivo com tumefação pétreia muito volumosa. Ecografia da tireoide descreve nódulo TR5 ocupando a hemitiróide direita e com sinais de invasão extra capsular, projetando-se sobre a veia jugular interna, e adenopatias níveis cervicais III. Após uma biopsia aspirativa não diagnóstica, realiza biopsia de agulha grossa que revela achados compatíveis com carcinoma anaplásico. Caso 2: Homem, 57 anos. Recorre ao SU por tumefação cervical esq com cerca de 6 semanas de evolução. Broncoscopia com redução de 50% do lúmen traqueal. Por suspeita de carcinoma da tireoide e comprometimento da via aérea, realiza biopsia de agulha grossa que revela linfoma de grandes células B. Inicia QT (RCHOP) com redução da massa cervical.

Discussão

O carcinoma anaplásico da tireoide é a forma menos comum de cancro da tireoide. Manifesta-se, frequentemente, como uma massa cervical de crescimento rápido e o comprometimento da via aérea é frequente. A sobrevida mediana é de 5 meses. As atitudes fundamentais na abordagem precoce são a rapidez no diagnóstico e estadiamento, e definição dos objetivos de tratamento.

Hospital:

Autores: Andrea Abreu, Ana Sofia Cavadas; Alexandra Antunes; Luís Castro; Marta Silva; Mário Reis