

# XLVI Congresso SPCir

## Resumo Póster



**ID Resumo:** 17638135880

**Capítulo:** Cuidados Intensivos, Trauma e Cirurgia de Urgência

**Tipo**  
Póster

### Título

Quando o cálculo pára o trânsito - Um caso de Íleus Biliar

### Introdução

O Íleus biliar é uma complicação rara da litíase biliar, através da migração de cálculos através de uma fístula bilio-entérica, e consequente, oclusão intestinal mecânica (<1% dos pacientes com esta patologia).

### Material e Métodos

Caso Clínico de doente 74 anos, sexo feminino, com antecedentes de diabetes e sem cirurgias abdominais prévias.

### Resultados

Recorreu ao Serviço de Urgência por um quadro de vômitos persistentes, dor abdominal localizada a nível do hipocôndrio direito e paragem de emissão de fezes (com 4 dias de evolução), associado a cetoacidose diabética. Manteve sintomatologia após compensação metabólica. Realizou TC Abdominopélvica que revelou: "Sinais de fístula colecisto-duodenal (?) No íleon proximal, impactação de formação litíásica com 2,8cm, com valorizável dilatação das ansas de delgado a montante e da cavidade gástrica." Foi submetida a Enterolitotomia, sem intercorrências na cirurgia e no pós-operatório imediato.

### Discussão

O Íleus biliar é uma patologia rara com diagnóstico desafiante. O exame de imagem de eleição é a TC e o tratamento é cirúrgico, com foco na enterolitotomia. Em casos selecionados, pode realizar-se uma abordagem de todo o quadro em tempo único cirúrgico com enterolitotomia, colecistectomia e correção da fístula. Em pacientes idosos ou instáveis, a enterolitotomia isolada é a opção mais segura.

**Hospital:** Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE

**Autores:** Rita Ruivo; Coelho, S.M.; Martins, M.F.; Escosteguy, J.; Albuquerque, S.P.; Carrasco, N.; Gomes, G.; Duro, E.