


# XLVI Congresso SPCir

## Resumo Póster



**ID Resumo:** 17634095640

**Capítulo:** Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

**Tipo**  
Póster

### **Título**

Da Trombocitopenia À Quimioterapia: Esplenectomia Como Ponte Terapêutica No Carcinoma Da Mama Localmente Avançado.

### **Introdução**

A trombocitopenia grave em contexto de hiperesplenismo pode inviabilizar terapêuticas oncológicas potencialmente curativas. A abordagem cirúrgica pode ser uma estratégia de otimização hematológica em doentes selecionados.

### **Material e Métodos**

O objetivo passa por descrever um caso de hiperesplenismo num diagnóstico inaugural de carcinoma da mama com indicação para quimioterapia (QT) primária. Apresentamos o caso de uma mulher, 53 anos, com antecedentes de trombose da veia porta e hiperesplenismo, com respetivo estudo de trombofilias negativo. A doente foi avaliada em consulta por carcinoma ductal invasor localmente avançado, HER2+, com metastização axilar homolateral. Pela trombocitopenia grave, a QT primária estava contraindicada. Após avaliação multidisciplinar, com administração de avatrombopag e vacinação protocolar, foi proposta esplenectomia.

### **Resultados**

Submetida a esplenectomia laparotómica com colocação simultânea de cateter totalmente implantado, sem intercorrências. Observou-se recuperação hematológica compatível com o início de QT.

### **Discussão**

AA esplenectomia pode ser crucial em citopenias secundárias que inviabilizam terapêuticas oncológicas. A ponderação entre risco cirúrgico e benefício sistémico deve ser criteriosa e multidisciplinar. Nesta caso, a cirurgia permitiu ultrapassar uma limitação hematológica crítica, possibilitando QT primária. Destaca-se o papel da cirurgia como ponte terapêutica e o impacto da coordenação entre especialidades para melhores outcomes.

### **Hospital:**

**Autores:** Catarina Leonardo de Viveiros, Samuel Barros Silva, Marcelo José Costa, Rita Lages, Rui Neves.