

XLV Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17324846384

Capítulo: Colo-Proctologia

Tipo
Póster

Título

Nódulo da Irmã Mary Joseph como manifestação inicial de doença

Introdução

O nódulo da Irmã Mary Joseph é uma metástase cutânea periumbilical, geralmente associada a neoplasias em estadios avançados. Pode ser a primeira manifestação de doença.

Material e Métodos

Descrição de um caso clínico.

Resultados

Doente do sexo feminino, de 77 anos, dirigiu-se ao SU por onfalite com 2 meses de evolução, refratária ao tratamento. Ao exame objetivo, constatou-se uma lesão dura e irregular, pelo que se realizou uma biópsia incisional que revelou tratar-se de uma metástase cutânea de adenocarcinoma colorretal. A doente realizou estudo complementar que confirmou adenocarcinoma invasor do colon sigmoide com metastização umbilical e hepática, tendo sido submetida a terapêutica paliativa com FOLFOX e bevacizumab. Após 10 ciclos, realizou controlo imagiológico com TC TAP, PET-FDG e colonoscopia com evidência de regressão completa do tumor primário e da lesão hepática, persistindo nódulo peri-umbilical e evidenciando metastização peritoneal e lesão hipermetabólica no colo uterino. Foi observada pela ginecologia e a citologia cervico-vaginal foi compatível metástase cervical. Retomou quimioterapia com FOLFIRI, no entanto, evoluiu desfavoravelmente com deterioração do estado geral, dor não controlada e quadros repetidos de suboclusão intestinal, que conduziu a internamento em Unidade de Cuidados Paliativos. A doente faleceu cerca de 2,5 anos após o diagnóstico inicial.

Discussão

Uma elevada suspeição clínica é imprescindível para evitar o atraso da marcha diagnóstica e terapêutica.

Hospital:

Autores: Dra. Inês Bertão Colaço; Dra. Mafalda Canha; Dra. Margarida Luís; Dra. Sara Andrade; Dra. Daniela Pato Pais; Dr. Hugo Maciel Ribeiro; Dr. José Mário Cecílio