XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17633119521
Capítulo: Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço

Tipo
Póster

Título
Massa cervical em adulto: diagnóstico e abordagem de quisto de segunda fenda branquial

Introdução
A presença de uma massa cervical em adultos representa um sinal clínico que requer avaliação cuidadosa, dada a ampla variedade de causas, benignas ou malignas, presumindo-se malignidade até prova em contrário. Quistos branquiais, embora comuns em crianças e adolescentes, podem surgir em adultos quando não são previamente diagnosticados ou após episódio de infeção. O reconhecimento adequado e a avaliação diagnóstica criteriosa são essenciais para definir a conduta terapêutica apropriada. Os autores descrevem os aspetos clínicos e tratamento a propósito de um caso clínico.

Material e Métodos
Relato de caso com consulta do processo clínico do doente.

Resultados
Homem de 55 anos, com história de massa cervical direita com dois anos de evolução, de crescimento progressivo. Ecograficamente com uma formação capsulada e hipoecogénica, medindo 64x50 mm, anterior ao pedículo vascular. Devido à necessidade de esclarecimento diagnóstica, realizou citologia por biópsia aspirativa, que se mostrou inconclusiva, tendo efetuado RM cervical, que descreve um quisto de segunda fenda branquial. Foi então submetido a exérese do quisto e laqueação da fenda branquial, que decorreu sem intercorrências.

Discussão
O doente teve alta ao 3º dia pós-operatório, sem complicações. O quisto branquial em adultos é raro, representando um desafio diagnóstico pela sua apresentação inespecífica e diagnósticos diferenciais. O diagnóstico precoce e a excisão cirúrgica adequada são fundamentais para prevenir recorrência.

Hospital:
Autores: Bruno Couto; Francisca Assunção; Ana Cabral; Catarina Rodrigues; Bárbara Gama; Filipe Madeira Martins; Isabel Rosa; Nisalda Rosa; Madalena Rosa; Fátima Bairos.