

# XLVI Congresso SPCir

## Resumo Póster



**ID Resumo:** 17633119521

**Capítulo:** Cirurgia Endócrina e da Cabeça e Pescoço

**Tipo**  
Póster

### Título

Massa cervical em adulto: diagnóstico e abordagem de quisto de segunda fenda branquial

### Introdução

A presença de uma massa cervical em adultos representa um sinal clínico que requer avaliação cuidadosa, dada a ampla variedade de causas, benignas ou malignas, presumindo-se malignidade até prova em contrário. Quistos branquiais, embora comuns em crianças e adolescentes, podem surgir em adultos quando não são previamente diagnosticados ou após episódio de infecção. O reconhecimento adequado e a avaliação diagnóstica criteriosa são essenciais para definir a conduta terapêutica apropriada. Os autores descrevem os aspetos clínicos e tratamento a propósito de um caso clínico.

### Material e Métodos

Relato de caso com consulta do processo clínico do doente.

### Resultados

Homem de 55 anos, com história de massa cervical direita com dois anos de evolução, de crescimento progressivo. Ecograficamente com uma formação capsulada e hipoecogénica, medindo 64x50 mm, anterior ao pedículo vascular. Devido à necessidade de esclarecimento diagnóstica, realizou citologia por biópsia aspirativa, que se mostrou inconclusiva, tendo efetuado RM cervical, que descreve um quisto de segunda fenda branquial. Foi então submetido a exérese do quisto e laqueação da fenda branquial, que decorreu sem intercorrências.

### Discussão

O doente teve alta ao 3º dia pós-operatório, sem complicações. O quisto branquial em adultos é raro, representando um desafio diagnóstico pela sua apresentação inespecífica e diagnósticos diferenciais. O diagnóstico precoce e a excisão cirúrgica adequada são fundamentais para prevenir recorrência.

### Hospital:

**Autores:** Bruno Couto; Francisca Assunção; Ana Cabral; Catarina Rodrigues; Bárbara Gama; Filipe Madeira Martins; Isabel Rosa; Nivalda Rosa; Madalena Rosa; Fátima Bairos.