

XLVI Congresso SPCir

Resumo Comunicação Oral



ID Resumo: 17636797080

Capítulo: Cirurgia Esófago-Gástrica

Sessão de Apresentação: CO8 (Cirurgia Esófago-Gástrica)

Tipo

Comunicação Oral

Título

Impacto do tratamento neoadjuvante na sobrevivência e recidiva dos adenocarcinomas do esófago

Introdução

O tratamento neoadjuvante mais adequado para o adenocarcinoma do esófago ainda está por identificar. O objetivo deste trabalho é o de comparar a terapêutica neoadjuvante exclusiva com QT (esquema FLOT perioperatória) com QT (esquema CROSS) combinada com RT pré-operatória, avaliando o seu impacto na sobrevivência livre de doença (SLD), sobrevivência global (SG) e taxa de recidiva (Rec).

Material e Métodos

Análise retrospectiva de 46 doentes, com adenocarcinoma do esófago, operados (com ressecção) entre 2016 e 2025. Foram divididos em dois grupos: Grupo 1 com 14 doentes, submetidos a FLOT exclusivo; Grupo 2 com 32 doentes submetidos a QRT com esquema CROSS. Foram comparadas a SLD, SG e Rec.

Resultados

Não houve diferença significativa na SLD ($p=0.626$), SG ($p=0.278$) e a taxa de recidiva ($p=0.489$) entre os dois grupos. Estes dados não confirmam o que foi recentemente descrito na literatura, inclusivamente no ESOPEC trial (2025) que demonstrou a superioridade do FLOT.

Discussão

Contrariamente aos resultados do ESOPEC trial este trabalho não demonstrou superioridade de nenhuma das duas modalidades terapêuticas, talvez por causa do nosso pequeno número de casos

Hospital:

Autores: Ines Prior, Diogo Paula, Tiago Antunes, Bernardo Sampainho, Filintio Gunza, Pedro Serralheiro, Antonio Bernardes