

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17638692302

Capítulo: Cuidados Intensivos, Trauma e Cirurgia de Urgência

Tipo
Póster

Título

Invaginação intestinal idiopática no adulto

Introdução

A invaginação intestinal é uma condição rara no adulto. A orientação terapêutica depende de diversos factores, nomeadamente do local, dimensão e viabilidade intestinal do segmento envolvido, sendo que, na maioria dos casos, exige uma intervenção cirúrgica.

Material e Métodos

Sexo masculino, 44 anos de idade. Sem antecedentes pessoais relevantes. Recorre ao SU por quadro de dor e distensão abdominal associada a náuseas e vômitos. Analiticamente apenas ligeira leucocitose com neutrofilia, PCR negativa. Realiza TC abdominal e pélvica que revela: "No flanco direito há sugestão de invaginação ileo-cecal, associado a derrame e densificação da gordura na mesma topografia."

Resultados

Proposto para laparotomia exploradora. Resultado anatomopatológico da peça de ressecção ileocecal: "necrose isquémica transmural do íleon".

Discussão

A invaginação idiopática / primária é responsável por 10% dos casos em adultos. O diagnóstico é geralmente feito por tomografia computadorizada e o tratamento quase sempre cirúrgico, com ressecção do segmento afectado.

Hospital:

Autores: Patrícia Bernardo, Marta Morais, Isabela Rosmaninho, Sofia Rufino, Cláudia Galvão, Zara Caetano