

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17636712253
Capítulo: Cirurgia Mamária
Sessão de Apresentação: PO5 (Cirurgia Mamária)

Tipo
Póster

Título

Quando o rastreio não basta: ptose orbitária como primeiro sinal de cancro de mama

Introdução

O cancro da mama é o mais prevalente em mulheres em Portugal, sendo alvo de rastreio nacional, e embora as metástases orbitárias sejam um local de disseminação conhecido, a sua ocorrência como manifestação ab initio é extremamente rara. **Objetivo:** Narrar apresentação inicial involgar de cancro de mama

Material e Métodos

Apresentação de caso clínico

Resultados

Mulher, 55 anos, sem antecedentes de relevo, com ptose palpebral esquerda com meses de evolução. Realizou biópsia de massa orbitária esquerda que revelou metástase de carcinoma lobular da mama, apesar de mamografia recente sem alterações. Nova mamografia e ecografia evidenciaram uma área sólida hipocogénica e heterogénea com 5cm, compatível com massa palpável no quadrante superoexterno direito, cuja biópsia confirmou a neoplasia. Realizou RM mamária que mostrou adenopatias axilares ipsilaterais compatíveis com invasão axilar e outras duas áreas sugestivas de multifocalidade, sem evidência de outros locais de metastização no restante estadiamento. Dado tratar-se de um tumor cT3N+M1, com recetores hormonais positivos, HER2 negativo, a doente iniciou letrozol e ribociclib

Discussão

O cancro de mama tende a metastizar para osso, fígado, pulmão e cérebro. A metastização ocular, incomum, ocorre sobretudo em doentes já diagnosticados e no subtipo lobular, sendo este o 2º caso reportado em que a metástase orbitária foi a manifestação inicial. **Conclusão:** Este caso ilustra a importância da suspeição clínica perante sintomas atípicos, mesmo na ausência de história oncológica

Hospital: Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE

Autores: Rita Dionísio Buco, Sofia Dias, Ana Luísa Rodrigues, Gustavo Capelão, Margarida Torgal, Fausto Carvalheira, Maria Inês Coelho, Miguel Coelho dos Santos