XLVI Congresso SPCir
Resumo Póster

ID Resumo: 17639352870
Capítulo: Coloproctologia
Sessão de Apresentação: PO2 (Colo-Proctologia)

Tipo
Póster

Título
Fibroadenoma Perianal: quando o incomum se torna real

Introdução
As glândulas mamárias-like anogenitais são glândulas do tipo sudoríparas, histologicamente semelhantes ao tecido mamário. O fibroadenoma das glândulas mamárias-like (FGML) é uma lesão benigna rara, encontrada na vulva e, em menor frequência, no ânus e região perianal. Objetivo: Descrição de caso clínico de fibroadenoma das glândulas mamárias-like.

Material e Métodos
Colheita de história clínica e revisão de literatura.

Resultados
Mulher, 49 anos, antecedente de fibroadenoma mamário (em vigilância imagiológica), com massa perianal com 6 anos de evolução, com suspeita ecográfica de quisto sebáceo. Encaminhada para consulta por aumento das dimensões da massa (6.5x5.5cm), localizada a 2 cm da margem anal. Submetida à excisão sob anestesia geral (resultado anatomopatológico - fibroadenoma das glândulas mamárias-like).

Discussão
O FGML é uma entidade rara, pouco conhecida, frequentemente confundida com outras patologias, sendo o seu diagnóstico maioritariamente histológico. Esta patologia deve ser tida em consideração no diagnóstico diferencial de massas perianais, de forma a evitar terapêuticas desnecessárias. O diagnóstico concomitante de fibroadenoma mamário levanta a hipótese de ambos estarem relacionados. Não existe uma abordagem definida e consensual aos FGML, no entanto a excisão cirúrgica permite o tratamento dos sintomas e o esclarecimento da etiologia e do comportamento da lesão.

Hospital:
Autores: Carolina Seco*, Beatriz Mendes, Pedro Almeida, Bárbara Santos, Catarina Santos, Mariana Machado, Elizabeth Cruz, Sofia Pina, Miguel Cunha, Edgar Amorim * Autor Correspondente Email do Autor Correspondente: carolina_seco@hotmail.com Serviço de Cirurgia 2, Hospital de Portimão, Unidade Local de Saúde do Algarve