

XLVI Congresso SPCir

Resumo Comunicação Oral



ID Resumo: 17639255140

Capítulo: Colo-Proctologia

Sessão de Apresentação: CO5 (Colo-Proctologia)

Tipo

Comunicação Oral

Título

Preditores de recorrência após cirurgia de abscesso perianal: implicações na prática clínica

Introdução

Os abscessos perianais representam uma das manifestações mais frequentes da patologia supurativa anorreta. A drenagem cirúrgica é o tratamento de eleição, com recorrência entre 10-30. Este estudo tem por objetivo a identificação precoce de fatores de risco associados à recorrência, passo fundamental para melhores outcomes.

Material e Métodos

Análise unicêntrica, retrospectiva, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024, foram incluídos 257 doentes. Foi realizado o Teste Qui Quadrado.

Resultados

A idade média foi de 53,6 anos e 86,4% eram do sexo masculino. A taxa de recorrência foi de 25%. Houve uma associação estatisticamente significativa com Doença de Crohn (OR 6,34; IC95% 1,95-20,63; $p < 0,001$) e a presença de fístula perianal (OR 2,35; IC95% 1,26-4,43; $p = 0,007$). O tipo e complexidade da fístula mostraram apenas tendência para aumento do risco. Tabagismo, febre e corticoterapia não tiveram significância estatística. Diabetes, HIV e hidradenite supurativa não se associaram à recidiva.

Discussão

Doença de Crohn e fístula perianal são os principais preditores de recorrência por abscesso perianal. Estes doentes poderão beneficiar de vigilância mais apertada e abordagem cirúrgica individualizada. Os resultados reforçam a importância de uma abordagem terapêutica que tenha em conta estes fatores de prognósticos, com impacto direto na prática clínica e nos resultados a longo prazo.

Hospital:

Autores: Autores: Filíntio Gunza, Mariana Belo Cruz, Diogo Paula, Tiago Antunes, Pedro Silva-Vaz, Jose Guilherme Tralhão.