

# XLVI Congresso SPCir

## Resumo Vídeo



**ID Resumo:** 17639254991

**Capítulo:** Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática

**Tipo**  
Vídeo

### Título

Abordagem Minimamente Invasiva na Metástase Hepática Isolada de CCR

### Introdução

O fígado é o mais afetado na metastização à distância do carcinoma colorretal (CCR), surgindo em cerca de 25% dos doentes ao longo da doença. A abordagem evoluiu nos últimos anos, com avanços na quimioterapia (QT), compreensão da biologia tumoral e ampliação dos critérios cirúrgicos. Atualmente, a hepatectomia com margens negativas é a principal opção potencialmente curativa, com sobrevida a 5 anos > 40%.

### Material e Métodos

Processo clínico eletrónico e vídeo da cirurgia.

### Resultados

Homem, 58 anos com um adenocarcinoma do reto alto cT3N+M0 em 2020, tratado com radioterapia neoadjuvante, resseção anterior baixa e QT adjuvante. Em 5/2022 com recidiva ganglionar, iniciando QT paliativa. Em 2/2025, a TC TAP de vigilância detetou lesão de 25mm suspeita no segmento 4. A PET-FDG com captação hepática exclusiva e a RM hepática confirmou lesão única. Após discussão multidisciplinar, feita resseção hepática atípica laparoscópica. Alta a D3 sem complicações pós-operatórias. A histologia confirmou adenocarcinoma de fenótipo intestinal com margens cirúrgicas livres.

### Discussão

A resseção hepática laparoscópica é segura e eficaz em metástases isoladas de CCR, mesmo após QT paliativa. Reforça-se a importância da avaliação multidisciplinar na seleção de doentes candidatos a cirurgia, com bom controlo oncológico local e a menor morbidade perioperatória possível.

**Hospital:** Centro Hospitalar do Porto, EPE

**Autores:** Lourenço Thierstein, Mariana Soares Duarte, Paula Marques, Tiago Sá, Cláudio Silva, Sílvia Pereira, Vítor Simões, António Canha, Jorge Daniel