XLVI Congresso SPCir
Resumo Vídeo

ID Resumo: 17639254991
Capítulo: Cirurgia Hepáto-Bilio-Pancreática
Tipo
Vídeo

Título
Abordagem Minimamente Invasiva na Metástase Hepática Isolada de CCR

Introdução
O fígado é o mais afetado na metastização à distância do carcinoma colorretal (CCR), surgindo em cerca de 25% dos doentes ao longo da doença. A abordagem evoluiu nos últimos anos, com avanços na quimioterapia (QT), compreensão da biologia tumoral e ampliação dos critérios cirúrgicos. Atualmente, a hepatectomia com margens negativas é a principal opção potencialmente curativa, com sobrevida a 5 anos > 40%.

Material e Métodos
Processo clínico eletrónico e vídeo da cirurgia.

Resultados
Homem, 58 anos com um adenocarcinoma do reto alto cT3N+M0 em 2020, tratado com radioterapia neoadjuvante, resseção anterior baixa e QT adjuvante. Em 5/2022 com recidiva ganglionar, iniciando QT paliativa. Em 2/2025, a TC TAP de vigilância detetou lesão de 25mm suspeita no segmento 4. A PET-FDG com captação hepática exclusiva e a RM hepática confirmou lesão única. Após discussão multidisciplinar, feita resseção hepática atípica laparoscópica. Alta a D3 sem complicações pós-operatórias. A histologia confirmou adenocarcinoma de fenótipo intestinal com margens cirúrgicas livres.

Discussão
A resseção hepática laparoscópica é segura e eficaz em metástases isoladas de CCR, mesmo após QT paliativa. Reforça-se a importância da avaliação multidisciplinar na seleção de doentes candidatos a cirurgia, com bom controlo oncológico local e a menor morbilidade perioperatória possível.

Hospital: Centro Hospitalar do Porto, EPE
Autores: Lourenço Thierstein, Mariana Soares Duarte, Paula Marques, Tiago Sá, Cláudio Silva, Silvia Pereira, Vítor Simões, António Canha, Jorge Daniel