

# XLVI Congresso SPCir

## Resumo Póster



**ID Resumo:** 17639378250

**Capítulo:** Colo-Proctologia

**Tipo**  
Póster

### Título

A importância da TAMIS na seleção de cirurgia colorretal radical a realizar

### Introdução

A presença de lesões síncronas malignas do cólon e reto é rara, rondando os 1,5-8%. A ressecção transanal por TAMIS constitui uma ferramenta minimamente invasiva de relevo na abordagem das lesões do reto distal, permitindo cirurgias mais poupadoras de órgão.

### Material e Métodos

Exposição de caso clínico.

### Resultados

Sexo feminino, 69 anos. Antecedentes de apendicectomia laparoscópica. Em contexto de PSOF positiva, realizou EDB, com identificação de adenocarcinoma a 14cm da margem anal e uma lesão plana granular (IIa + Is) com 30 mm no reto distal, justa-linha pectínea. Identificou-se, também, lesão não passível de exérese endoscópica na VIC e múltiplos pólipos ao longo do cólon. TC TAP sem evidência de metastização à distância. RM pélvica do tumor do reto alto cT3cN1b EMVI+ CRM. Decidido biópsia excisional de lesão do reto distal por TAMIS, realizada em fev/25, confirmando adenoma tubulo-viloso com displasia de baixo grau. Realizou QT/RT seguida de QT (esquema TNT). Exames de re-estadiamento a evidenciar significativa resposta terapêutica. Submetida a proctocolectomia subtotal laparoscópica com poupança do resto distal em nov/25.

### Discussão

Em situações com múltiplas lesões colorretais, a realização de TAMIS poderá permitir uma avaliação local e tratamento minimamente invasivo de lesões distais, por vezes esclarecendo a sua benignidade. Esta estratégia pode evitar ressecções mais extensas e colostomias definitivas, favorecendo abordagens mais conservadoras e uma melhoria significativa da qualidade de vida.

**Hospital:** Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE

**Autores:** Mariana Miranda, Miguel Magalhães, Catarina Henriques, Patrícia Matos, Maria Leonor Matos, Sara Lourenço, Jorge Costa, Mário Nora