

XLVI Congresso SPCir

Resumo Póster



ID Resumo: 17639271911

Capítulo: Colo-Proctologia

Tipo
Póster

Título

Lipoma Ileocecal Sintomático: uma etiologia rara

Introdução

Os lipomas do intestino delgado são tumores submucosos benignos e, apesar de raros são a segunda maior causa de tumores benignos neste local. A maioria são pequenos e assintomáticos, no entanto podem complicar com intussuscepção, hemorragia digestiva ou oclusão. Este trabalho mostra um caso de hemorragia digestiva baixa (HDB) e intussuscepção ileocólica causadas por um lipoma da válvula ileocecal.

Material e Métodos

-

Resultados

Homem de 59 anos, com cardiopatia isquêmica sob dupla antiagregação, recorre ao Serviço de Urgência por HDB com 1 semana de evolução, anemia e necessidade transfusional. A TC abdominopélvica mostrou uma imagem lipomatosa ileocecal. A EDB identificou no íleo terminal uma lesão subepitelial de 25 mm, com área ulcerada e pigmento hemático aderente. O doente ficou internado para estabilização e vigilância. Devido ao elevado risco isquêmico e necessidade de retomar dupla antiagregação foi proposta ressecção cirúrgica. Submetido a colectomia direita laparoscópica ao 9º dia de internamento: intraoperatoriamente verificou-se intussuscepção ileocólica. O exame histológico confirmou lipoma submucoso de 32mm com erosão e ulceração da mucosa adjacente. Pós-operatório favorável com alta ao 3º dia. Seguimento em consulta sem complicações, alta aos 6 meses de seguimento.

Discussão

Os lipomas intestinais podem provocar complicações. O diagnóstico e tratamento devem ser feitos precocemente. O tratamento implica ressecção cirúrgica, sendo a via laparoscópica segura em equipas com experiência.

Hospital:

Autores: Marta Ferreira Martins, Inês Romero, Vânia Fernandes, Susana Costa